

# PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL ACTO DE LA VACUNACIÓN

Marta Bernal Sánchez-Arjona, D.U.E. U.G.C. Utrera Norte; M<sup>a</sup> Leonor Escot Domínguez, D.U.E. U.G.C. Utrera Norte; M<sup>a</sup> Dolores Rodríguez Surián, D.U.E. U.G.C. Utrera Sur. Sevilla. Spain.

- OBJETIVOS:**
- Elaborar una guía práctica con los principales pasos a seguir en el acto de la vacunación, basados en la evidencia científica y en nuestra experiencia con la población asignada a nuestro centro de salud.
  - Proporcionar las recomendaciones necesarias para mejorar la praxis diaria.

**MÉTODO:** Estudio descriptivo observacional en el que se detalla de forma clara y concisa como se realiza una correcta vacunación.

**RESULTADOS:** Se dispone de un protocolo de actuación para la correcta manipulación y administración de vacunas que procedemos a detallar a continuación.

## 1.- ANAMNESIS PREVIA A LA VACUNACION:

- \* Valoración del estado de salud del paciente (fiebre últimas 24h; reacciones alérgicas previas; medicación que toma.)
- \* Comprobación del carnet de vacunación (intervalo entre dosis y compatibilidad de vacunas; si faltan dosis previas realizar una pauta acelerada de vacunación).

## 2.- ACTO DE LA VACUNACION:

- \* Sacar la vacuna de la nevera 5 ó 10 minutos antes de la administración.
- \* Comprobar que la vacuna retirada corresponde con la vacuna a administrar.
- \* Comprobar caducidad.
- \* Inspección ocular de la misma.
- \* Proceder a la limpieza de manos.
- \* Desinfección de la piel en la zona a vacunar.
- \* Uso de material estéril.
- \* **Técnica, lugar anatómico y aguja de elección:**
  - + VACUNA INTRAMUSCULAR DE 0 A 12: Muslo, tercio sup. cara antero lateral, técnica del aplanado, ángulo 90º, aguja 25 mm, en prematuros y bajos peso aguja 16 mm.
  - +VACUNA SUBCUTANEA DE 0 A 12 MESES. Muslo, tercio sup. cara antero lateral, técnica del pellizco, ángulo 45º, aguja 16 mm.
  - +VACUNA INTRAMUSCULAR MAYORES DE 12 MESES: -Deltoides, técnica del aplanado, ángulo 90º, aguja 16 ó 25 mm.
  - Muslo, tercio sup. cara antero lateral, técnica del aplanado, ángulo 90º, aguja 25mm, SI EL NIÑO NO CAMINA.
  - +VACUNA SUBCUTANEA MAYORES DE 12 MESES: Deltoides, técnica del pellizco, ángulo 45º, aguja 16 mm.

## 3.- REGISTRO DE LA VACUNA:

- \* Fecha. \* Tipo de vacuna. \* Nombre comercial, lote y fecha de caducidad.
- \* Lugar anatómico y vía de administración. \* centro de vacunación y firma del profesional.

- CONCLUSIONES:**
- \* La efectividad de la vacuna esta relacionada con su correcta manipulación y administración.
  - \* El registro de las vacunas es de vital importancia para conseguir un correcto seguimiento en el proceso de vacunación y evitar errores.
  - \* El profesional de enfermería que trabaja en el ámbito de vacunas debe conocer a la perfección el manejo de éstas, para contribuir al éxito de la vacuna.

