

# COMPRESIÓN DE LA PRUEBA PARA DETECCIÓN DE VPH Y DISPOSICIÓN A REPETIRLA

Clara Irene Hernández, Eva Hernández  
Profesoras Investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública de México

## INTRODUCCIÓN


Como una alternativa para mejorar los programas de detección de cáncer cervical y su accesibilidad a la población, se ha desarrollado la prueba para detectar papilomavirus oncogénicos y que permite la detección de lesiones cervicales con gran certidumbre en mujeres que por diversas razones, nunca se han practicado un Papanicolaou, así como la identificación de mujeres en riesgo de padecer cáncer cervical. Los procedimientos que implica esta prueba son realizados en la gran mayoría de las veces por personal de enfermería, quien se encarga de convencer a la mujer, informarle sobre los beneficios de la detección, las generalidades de la enfermedad y la manera en que debe tomarse la muestra. El objetivo de la presente investigación es determinar si la explicación dada a la mujer es comprendida y los factores de la mujer que intervienen en esa comprensión, así como la asociación de la comprensión de la información recibida con la disposición de las mujeres a repetir la auto-toma vaginal.

## MÉTODOS

Se aplicó un cuestionario a 693 mujeres del Estado de Morelos que se habían realizado la prueba de detección de ADN de VPH. Se interrogó a las mujeres sobre la información recibida del personal médico y de enfermería a cerca de la prueba, la comprensión de la información recibida y la disposición de la mujer a repetir la prueba. Se realizó análisis bivariado y modelos de regresión logística ajustados por edad y escolaridad. Se manejaron intervalos de confianza al 95%.

## RESULTADOS

ESCOLARIDAD DE LAS MUJERES Y ENTENDIMIENTO DE LA EXPLICACIÓN



| EXPLICACIÓN Y COMPRESIÓN DE LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE VPH          | SITIO DE COLECCIÓN DE MUESTRAS |                      | ACEPTA REPETIR LA PRUEBA        |                                 |                          |                                 |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|  | HOGAR<br>47.1%                 | CONSULTORIO<br>52.9% | SI                              | NO                              | TAL VEZ                  | NO SÉ                           |
| Le explicaron y entendió lo que es la prueba de VPH (69.42%)       | 66.77%                         | 71.88%               | <b>OR 2.20</b><br>(1.48 - 3.26) | OR 0.42<br>(0.27 - 0.66)        | OR 1.08<br>(0.20 - 5.61) | OR 0.61<br>(0.28 - 1.35)        |
| Le explicaron pero no entendió lo que es la prueba de VPH (11.30%) | 12.00%                         | 10.68%               | OR 0.81<br>(0.46 - 1.45)        | OR 0.57<br>(0.25 - 1.29)        | OR 1.3<br>(0.15 - 10.96) | <b>OR 4.27</b><br>(1.84 - 9.88) |
| No le explicaron lo que es la prueba de VPH (19.28%)               | 21.23%                         | 17.54%               | OR 0.40<br>(0.26 - 0.63)        | <b>OR 3.59</b><br>(2.25 - 5.72) | OR 0.71<br>(0.08 - 6.01) | OR 0.33<br>(0.07 - 1.43)        |

## CONCLUSIONES

Para la realización de la prueba de detección de VPH es necesario considerar que la información proporcionada a la mujer y su comprensión juegan un papel determinante en la disposición a continuar realizándose la prueba, lo que favorece la detección de Cáncer Cervical así como la identificación de mujeres en riesgo y por ende mayor probabilidad de brindar tratamientos oportunos y evitar muertes prematuras por esta causa.

Cuando la mujer ha comprendido la información, tiene mayor probabilidad de repetir la prueba, si no entiende la explicación, duda en repetirla y si no se le brinda información, definitivamente la mujer no se volverá a realizar. Es importante tener presente que el nivel de escolaridad de la mujer se relaciona con el grado de comprensión de la información recibida, por lo que el personal de enfermería que brinda la información debe prestar especial atención a mujeres de bajo nivel académico asegurándose que han comprendido en su totalidad la información proporcionada. La enfermera de primer nivel de atención debe contar con amplio conocimiento del tema, hablar con términos de fácil comprensión y conocer a la población a la que se dirige. Por las implicaciones sociales de la infección, se requiere de espacios adecuados que favorezcan la privacidad y la confianza para que la mujer se sienta en libertad de aclarar todas sus dudas. El conocimiento que la población tenga sobre aspectos de salud es determinante para lograr su colaboración y su participación continuada en los programas de prevención de enfermedades.

## BIBLIOGRAFIA

Araujo E, Barroso S, Cendón A, Muñoz M, Ortunio M, Cardozo R et al. Infección por virus de papiloma humano en mujeres: hallazgos paraclínicos. Rev Obstet Ginecol Venez Jun 2010; 70(2): 82-89.

Sanabria J. Virus del Papiloma humano. Artículo de revisión 2012. Disponible en: <http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/virusdelpapilomahumanosanabria.pdf>