


# ENFERMERIA AVANZADA EN URGENCIAS :MANEJO DEL DOLOR Y FIEBRE EN CONSULTA DE RECEPCIÓN, ACOGIDA Y CLASIFICACIÓN .

## INTRODUCCIÓN:

- **JUSTIFICACIÓN:** La administración de medicación de forma precoz en la consulta RAC de nuestro hospital comarcal de Andújar, desde el año 2011 en determinadas situaciones, todas ellas protocolizadas, mejora la atención centrada en el paciente.
- **OBJETIVO:** Proporcionar a los profesionales sanitarios (enfermería en el área de Urgencias), del conocimiento imprescindible y necesario para la evaluación de aquellos pacientes que se puedan beneficiar de tratamiento desde la consulta de RAC.

## TECNICA:



## REFLEXIONES:

Se reduce ansiedad de familia y paciente ante la situación de dolor o fiebre, evitando complicaciones derivadas y disminuyendo tiempo de espera en el inicio del tratamiento.  
 Potencia la seguridad del paciente y su confort.  
 Barreras encontradas: algunos pacientes prefieren que el facultativo inicie el tratamiento .  
 Como proyecto futuro pensamos en la creación de la consulta finalista de enfermería.

## MATERIAL:



TERMÓMETRO



ESCALA DOLOR EVA

ADULTOS	NINOS
DOLOR MUSCULOESQUELÉTICOS Y TX MENORES	DOLOR MUSCULOESQUELÉTICOS Y TX MENORES
EVA 3-4 IBUPROFENO 600 MGR VO Ó NOLOLIL 575 MGR VO.	EVA 3-7 IBUPROFENO 2% 0.42ML/KG VO
EVA 5-7 KETOROLACO 30MG SC Ó IBUPROFENO 600MGR VO.	
OTALGIAS Y ODONTALGIAS KETOROLACO 30 MGR SC Ó METAMIZOL 575 MGR VO.	OTALGIAS Y ODONTALGIA EVA 3-7 PARACETAMOL 0.15ML/KG VO
FIEBRE PARACETAMOL 1 GR Ó IBUPROFENO 600 MGR.	FIEBRE IBUPROFENO 2 % 0.42 ML/ KG VO Ó PARACETAMOL 0.15 ML/ KG VO

TABLA MEDICACIÓN Y DOSIS SEGÚN MOTIVO DE CONSULTA

## CONTRAINDICACIONES:

- PARA MANEJO DEL DOLOR:
- Dolor severo >7
- Alergia a Aines
- Patología tracto digestivo superior
- Enfermedad hepática
- Insuficiencia renal
- Embarazo/lactancia

### PARA MANEJO DE LA FIEBRE:

- Niños de 0-3 meses con >38°C.
- Niños de 3 meses a 3 años con >38.5°C y mal estado general.
- Adultos de >16 años con 38.5°C e inestabilidad hemodinámica, distrés respiratorio, alteración del nivel de conciencia y mal estado general.
- Adultos >38.5°C inmunodeprimidos.
- Alergia a Aines y paracetamol.
- Enfermedad hepática.
- Vómitos asociados < de 4 horas.
- Toma de antitérmicos previa a la consulta de RAC.