

# IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA NO APLICABILIDAD DE LA TETANALGESIA EN EL NEONATO HOSPITALIZADO

Autores: Casado Gómez, Cristina; Pavón de la Maya, M<sup>a</sup> José; Pazos Seoane, Laura.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

## INTRODUCCIÓN

Durante la hospitalización, los neonatos están sometidos a constantes procedimientos dolorosos y estresantes. Está demostrado que la lactancia materna realiza un efecto analgésico, no sólo por su propia composición, sino que además el neonato obtiene la seguridad de tener cerca a su madre, el contacto piel con piel y la distracción de su atención. El beneficio de la lactancia materna cuando se utiliza con el fin de aliviar el dolor del niño, se conoce como tetanalgesia.

## METODOLOGÍA


Se realiza un cuestionario validado, basado en la evidencia de la efectividad de la Tetanalgesia tras una revisión bibliográfica en bases de datos (Pubmed, Scielo y Cochrane, entre otros) y la consulta de un total de 20 artículos científicos, a los profesionales de las unidades de neonatología de nuestro hospital.

## OBJETIVO

Clarificar las causas de la no aplicabilidad de la tetanalgesia durante los procedimientos dolorosos realizados en el neonato hospitalizado.

## RESULTADOS

### CAUSAS DE LA NO PUESTA EN PRÁCTICA



## CONCLUSIONES

Se pone de manifiesto, que en nuestro ámbito de estudio, la principal causa que argumentan los profesionales para no emplear la tetanalgesia es la falta de experiencia en su aplicabilidad. Esta circunstancia, podría venir dada por otros factores subyacentes como son la falta de conocimiento, la dificultad para cambiar rutinas y la falta de tiempo, entre otros.

Se trata de una práctica de efectividad reconocida en la prevención del dolor, pero que no se ha llegado a implantar definitivamente en la unidad, por lo que sería necesario un estudio posterior con el fin de analizar las razones que llevan a esa falta de experiencia en su realización.