

SEGURIDAD DEL USUARIO EN EL PROGRAMA DE DIACETILMORFINA MEDIANTE LA ATENCIÓN ENFERMERA EN SALA DE TRATAMIENTO

Este póster realiza una descripción en forma de algoritmo del procedimiento de atención enfermera en la sala de Tratamiento del centro PEPSA (Programa de Heroína de Andalucía) para asegurar que el tratamiento con Diacetilmorfina (DAM) intravenosa se realiza de manera correcta y segura. Este centro de reducción del riesgo y del daño trata a una población usuaria de opiáceos por vía parenteral que ha fracasado en otros tratamientos disponibles y que sufren un deterioro biopsicosocial. Es imprescindible una atención enfermera diaria, integral e individualizada a cada persona usuaria para garantizar su seguridad en el tratamiento con DAM realizando una labor de supervisión, educación sanitaria, asistencia y recogida de datos.

AUTORAS: Plaza Andrés A, Reina Ruiz P, Ramos Gómez D.

El usuario ha sido valorado por enfermería y se encuentra en las condiciones necesarias para ser tratado con Diacetilmorfina

SALA DE TRATAMIENTO

Educación y supervisión en todo el proceso de autoadministración de la dosis:

- Asepsia en el lavado de manos previo a la autoadministración.
- Colocación del material necesario para la autoadministración.
- Asepsia en la zona de punción.
- Correcta colocación del compresor de uso individual.
- La correcta búsqueda del punto de punción mediante observación y palpación.
- Autoadministración de la dosis pautada de Diacetilmorfina.
- Corrección de malos hábitos adquiridos en los consumos fuera del centro (extracción e introducción de sangre de forma reiterada, inyección en cuello e inglés).
- La persona usuaria tendrá 3 intentos de la administración de la dosis intravenosa existiendo la posibilidad de asistencia enfermera en el último intento o si no es posible intramuscular.

Tras la inyección:

- Retirada del compresor y la compresión del punto de inyección para una correcta hemostasia.
- Desecho de la jeringa y aguja en el contenedor de residuos biológicos.
- Desecho de algodones y demás utensilios empleados en la papelera.
- Lavado de manos antes de salir de la sala.

Valoración

del efecto de la Diacetilmorfina en el usuario (nivel de sedación y de depresión respiratoria).

Recogida de información

relevante para la evolución del paciente (en aplicación informática).

Identificación y actuación

ante la aparición de posibles reacciones adversas y otras urgencias junto con medicina.

Paso a sala de observación

BIBLIOGRAFÍA

- Seidenberg A, Honegger U, Gebele U. Metadona, heroína y otros opioides: Manual para un tratamiento ambulatorio de mantenimiento con opioides. Escuela Andaluza de Salud Pública. Ediciones Díaz de Santos; 2000.
- Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Manual de Protocolos Asistenciales. Edita Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud y Bienestar Social. Sevilla. 2012 Disponible en: http://www.epes.es/anexos/publicacion/Manual_protocolos_a_sistenciales/MANUAL_DE_PROTOCOLOS_ASISTENCIALES.pdf
- March JC, Oviedo-Joekes E, Perea-Milla E, et al. Ensayo controlado de prescripción de heroína en el tratamiento de la adicción a opioides. Journal of Substance Abuse Treatment, 31 (2006): 203-211.
- Plaza A, Oviedo-Joekes E, March JC. Nursing in an Intravenous Heroin Prescription Treatment. Journal of Addictions Nursing, 18 (2007): 13-20
- Reina RP, Plaza A. Campaña Sanitaria en el PSP-PEPSA para enseñar un correcto lavado de manos entre los usuarios. Capítulo número 203. Libro de Ponencias 2º Congreso Internacional Virtual de Enfermería "Ciudad de Granada" "Calidad y Seguridad del paciente a través del cuidado continuo personalizado". Ed. SATSE Andalucía. 2012. Disponible en: http://www.congreso-enfermeria.com/participantes_2congreso.jsp