


# CUIDADOS ENFERMEROS EN INTENTO AUTOLÍTICO CON FÁRMACOS

Moreno Romero, C.; Gallego Galán, S.

## INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los pacientes que acuden a un centro sanitario tras la ingesta de medicamentos abusiva voluntaria, deben ser sometidos a una serie de cuidados enfermeros. El objetivo es prestarle al paciente unos cuidados individualizados según sus necesidades post ingesta de medicación y tras su paso por el servicio de urgencias.

## TÉCNICA



## DIAGNOSTICOS NANDA:


Riesgo de Lesión (00035) de 1978.

Riesgo de Suicidio (00150) del 2000.

Riesgo de Violencia Autodirigida (00140) de 1994.

## MATERIAL

- Revisión protocolos: Lavado gástrico e Ingreso en UHP (Unidad de Hospitalización Psiquiátrica).
- DSM-IV.
- NANDA, NIC, NOC (2009-2011)
- Escala de Glasgow.
- Escala de Valoración del riesgo de suicidio.



## OBSERVACIONES

La premisa en este tipo de pacientes es ocuparnos de su bienestar físico, e intentar restablecerlo lo antes posible. Durante su evolución hospitalaria es necesario que un equipo multidisciplinar se ocupe de su recuperación y de su posterior seguimiento para evitar, en la medida de lo posible, una recaída.

## BIBLIOGRAFÍA

- DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Juan J. López-Ibor Aliño. Elsevier Masson. 2007.
- Diagnósticos enfermeros (definiciones y clasificación 2009-2011). Comité Editorial Elsevier.