

Seguimiento Protocolizado del Tratamiento Farmacológico Individualizado en Pacientes con Anticoagulación Oral (año 2013)



Diez de los Ríos Rubio, Antonio A.; Molina Gomez, Vanessa

INTRODUCCION/OBJETIVO: Durante 2012 se llevó a cabo la formación de Enfermer@s para la acreditación profesional en Seguimiento Protocolizado del Tratamiento Farmacológico Individualizado en Pacientes con Anticoagulación Oral.

Evaluar los “indicadores de calidad”, definidos por el protocolo, de un año de práctica de prescripción colaborativa con pacientes en ttº anticoagulante oral al amparo del “Decreto por el que se define la actuación de l@s enfermer@s en el ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía”.

METODO: La muestra corresponde a la totalidad de pacientes atendidos, para seguimiento de su tratamiento de anticoagulación oral, durante el año 2013, en Consulta de Enfermería y a Domicilio pertenecientes a un cupo médico de un Centro de Salud de la Provincia de Málaga (Alhaurín de la Torre).




EDAD	♂	♀	
N	11	8	19
Máxima	93	85	93
Mínima	65	36	36
Media	76.2	69.7	73.5
Mediana	77	73.5	76



% PERMANENCIA EN RANGO		
En rango	214	76.2%
Fuera de rango	67	23.8%

PACIENTES CON >70% DE CONTROLES EN RANGO	
>70%	14 (73.7%)
<70%	5 (26.3%)

COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS		
Menores	1	5.26%
Mayores	0	0



PLAN DE CUIDADOS		
BdE	NOC	NIC
00078 Manejo infectivo del régimen terapéutico 00126 Conocimientos deficientes 00206 Riesgo de sangrado	1609 Conducta terapéutica 0409 Coagulación sanguínea 1813 Conocimiento régimen terapéutico	5240 Asesoramiento 5620 Enseñanza: Proceso enfermedad 5616 Enseñanza: Medicamentos prescritos 4010 Precauciones con hemorragias

Conclusiones:

- Se cumplen los indicadores: Permanencia en rango (% de controles en rango) y porcentaje de pacientes en rango (% de pacientes con 70% o más de los controles en rango)
- Solo el 1.4% de las consultas de enfermería (4 de 281) precisó de la derivación a otro profesional
- Incidencia prácticamente nula de complicaciones hemorrágicas, solo se registró una menor, epistaxis que se controló sin necesidad de derivar a urgencias hospitalarias.
- El 34% de las intervenciones (14 de 41) para ajustes de dosis o derivación se acumulan en 2 pacientes
- Al indicador “Descripción de la medicación prescrita”, el protocolo no le define estándar. 13 de los 19 pacientes (68.4%) obtenían una valoración >3 de la Escala Likert a los indicadores de NOC 1813 “Conocimiento: régimen terapéutico”, demostraban un conocimiento “sustancial” o “extenso”
- Creemos aconsejable para mejorar la “Descripción de la medicación prescrita”, y el “Conocimiento del régimen terapéutico”, plantear intervenciones no solo individuales en consulta, sino también organizar intervenciones grupales con pacientes y cuidadores