

## INTRODUCCIÓN

Clara Irene Hernández Márquez  
Profesora Investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública de México

Por su relación con el cáncer cervical el resultado de positividad a la detección de infección por VPH se convierte en una fuente generadora de ansiedad para la mujer infectada. Afecta los aspectos psicológicos y sociales, genera sentimientos de decepción, preocupación por su salud, temor a la muerte, miedo a tener relaciones sexuales y percepción de que tiene cáncer. Se ha mencionado que el impacto emocional y social causado por el diagnóstico puede ser más dañino que los problemas biológicos ocasionados por el virus, reportando reacciones emocionales en la mujer como enojo, depresión, aislamiento, miedo, rechazo, vergüenza o culpa. Para evitar esas reacciones, en México se ha tomado la iniciativa de no utilizar el término positivo a VPH al dar el resultado, sino que se ha recurrido a informar a la mujer que su resultado es "anormal" o bien que es "no concluyente", por lo que necesita acudir a exámenes diagnósticos. La presente investigación evaluó la actitud de las mujeres a las que se les dio el resultado de VPH de formas diferentes.

## MÉTODOS

Se analizó el autorreporte de 353 mujeres entre 27 y 80 años de edad, a las que se les había realizado la prueba de detección de VPH en el estado de Morelos, México, 55% de ellas fueron positivas a infección por VPH. Las participantes fueron asignadas aleatoriamente a cuatro grupos a los que se dio el resultado de cuatro formas: I. Positivo a VPH; II. Anormal; III. No concluyente y IV: Está bien. Se les preguntó que hicieron después de saber el resultado. Se realizó análisis univariado de las variables socio demográficas y análisis bivariado de la forma en que habían recibido el resultado y su conducta posterior a recibirlo.


## RESULTADOS

GRUPO DE EDAD		
	n	%
Menores de 36	84	23.8
De 36 a 55	208	58.92
56 o mas	61	17.28
Total	353	100

ESCOLARIDAD		
	n	%
Básica	212	60.06
Media Superior	92	26.06
Superior	49	13.88
Total	353	100

NIVEL SOCIOECONÓMICO		
	n	%
Bajo	97	27.48
Medio	147	41.64
Alto	109	30.88
Total	353	100

ACTITUD POSTERIOR AL CONOCIMIENTO DEL RESULTADO SEGUN GRUPO DE NOTIFICACIÓN



LOS RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO MUESTRAN QUE LAS MUJERES ACTÚAN DE ACUERDO A LA MANERA EN QUE SE LES INFORMA SOBRE SU RESULTADO, SIENDO EL GRUPO AL QUE SE LE DIJO DE MANERA DIRECTA QUE EL RESULTADO ERA POSITIVO A INFECCIÓN POR VPH, EL QUE ACUDIÓ EN MAYOR PROPORCIÓN A CONSULTAR A UN MÉDICO O A REALIZARSE EL PAPANICOLAOU.

LA PROPORCIÓN DE MUJERES A LAS QUE SE LES DIJO QUE SU RESULTADO FUE "ANORMAL" O "NO CONCLUYENTE" Y QUE NO ACUDIERON A RECIBIR ATENCIÓN FUE SIMILAR A LA PROPORCIÓN DE AQUELLAS CUYO RESULTADO FUE NEGATIVO (MAS DEL 80%) .

## CONCLUSIONES

Aún cuando se ha mencionado que el impacto emocional y social causado por el diagnóstico genera reacciones emocionales adversas en la mujer como enojo, depresión, aislamiento, miedo, rechazo, vergüenza o culpa, es la forma en que percibe el riesgo de padecer cáncer cervical y actúa de manera más positiva en busca de un diagnóstico de lesiones precursoras o cáncer. Cabe pensar si más que el conocimiento, la edad o la escolaridad es el miedo al cáncer y sus implicaciones lo que puede mover a la mujer a mejorar las prácticas de su auto cuidado. El uso de palabras ambiguas, para indicar un VPH positivo, ocasiona que la mujer no comprenda la relevancia de dicho resultado.

## BIBLIOGRAFIA

Castro-Vásquez Ma del Carmen, Arellano-Gálvez Ma del Carmen. Acceso a la información de mujeres con VPH, displasia y cáncer cervical in situ. Salud pública Méx [revista en la Internet]. 2010 Jun [citado 2014 Mar 20]; 52( 3 ): 207-212. Disponible en: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0036-36342010000300004&lng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342010000300004&lng=es).