


BRONQUIOLITIS : CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN UCI-P

Autores : Laura Asenjo Martínez / Silvia Bonachía Sainz / Sheila Capa Santamaría

La bronquiolitis es la infección de vía respiratoria baja más frecuente en los primeros meses de vida , el 80% lo causa el virus sincitial respiratorio (VRS), el 5% precisa ingreso hospitalario y el de ahí el 15% lo hace en UCIP siendo necesarios unos adecuados cuidados por parte del personal de enfermería. En los siguientes gráficos mostramos la incidencia de ingresos en la UCIP del Hospital Universitario de Burgos en el año 2013



PLAN DE CUIDADOS:

Principal diagnóstico de enfermería:

Patrón Respiratorio Ineficaz r/c proceso inflamatorio y estrechamiento de vías respiratorias, caracterizado por: tiraje, taquipnea y/o apnea, tos, cianosis, sibilancias...


- **NOC:** Respiraciones eficaces. Indicadores: permeabilidad de la vía aérea y signos vitales

- **NIC:** Actividades:

- Monitorización y vigilancia de los signos vitales: FC, FR, SatO₂, T^a
- Vigilar movimientos torácicos y uso de musculatura accesoria
- Posición semi-Fowler
- Oxigenoterapia: VMNI o invasiva si procede
- Aspirado nasofaríngeo para diagnóstico
- Medidas de aislamiento de contacto
- Administración de tto: broncodilatadores , antitérmicos , corticoides , atbs ...
- Fisioterapia respiratoria , lavados nasales y aspiración de secreciones s/p



FISIOPATOLOGÍA



CONCLUSIONES:

Esta patología genera elevados costes sanitarios, por tanto se requiere un conocimiento específico de la enfermedad, de los cuidados y del aparataje que se van a precisar y así disminuir la estancia del niño en UCIP

BIBLIOGRAFÍA :

- Aguilar, " Tratado de Enfermería Infantil: Cuidados Pediátricos". Elsevier. 2003
- David Wilson, "Manual de Enfermería Pediátrica de Wong". Mc Graw Hill. 2009