

EL CONTROL PRENATAL INDICADOR DE SEGURIDAD PARA EL INICIO PRECOZ DE LA LACTANCIA MATERNA? ESTUDIO EN EL HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA (HCM).

Autores: A.M. López-Franco Jiménez, E. López Cuevas.

Introducción


Aunque son bien conocidos los beneficios de la lactancia materna (LM), aún existen múltiples factores que interfieren en la instauración y continuidad de la misma. La pertenencia a ciertos grupos sociales junto a la falta de control prenatal son algunos de los factores de riesgo que interfieren en el establecimiento de una adecuada LM.

Conocer si el control prenatal es un indicador de seguridad para el establecimiento precoz de la LM, en el HCM en el año 2013.

Objetivos

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo de la relación entre el control prenatal, como indicador de seguridad en el inicio precoz de la LM en el año 2013, en gestantes atendidas, durante el parto y puerperio precoz, en el servicio de paritorio, con y sin control prenatal, en el HCM. Los datos obtenidos pertenecientes al período entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013, fueron proporcionados por el registro del HCM.



Discusión

Durante el año 2013, en el HCM se atendieron 2.443 partos, de los cuales 1022 fueron de gestantes con adecuado control del embarazo. De estas el 71.57% iniciaron precozmente la LM, frente a un 28.43% que no lo hicieron. En cuanto a las gestantes con embarazos deficientemente controlados, fueron 1421 las atendidas, de las cuales, el 51.46% procedieron al inicio de LM de forma precoz, frente a un 48.54% que no la establecieron.

Conclusiones

Los datos reflejan, que en aquellas gestantes que no siguieron un control prenatal adecuado, el porcentaje de éstas que no estableció LM de forma precoz, es más elevado con respecto a las que si lo hicieron. Aunque los resultados confirman los datos publicados en estudios anteriores, sería necesario establecer si hubo otras causas que impidieron el establecimiento de la misma.

Bibliografía:

- Félix Valenzuela JA, Martínez Caldera E, Sotelo Ham EI. Prevalencia y factores biosociales asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva. *Pediatría de México*, Vol. 13 Núm. 2-2011..
- Estévez González M^ªD, Martell Cebrián D, Medina Santana R, García Villanueva E, Saavedra Santana P. Factores relacionados con el abandono de la lactancia materna. *An Pediatr (Barc)*. 2002;56: 144-50. vol.56 núm 02.