

UTILIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA VÍA SUBCUTÁNEA EN HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES EN SITUACIÓN TERMINAL.

María de los Ángeles Muñoz Martínez.
Enfermera UGC Cuidados Paliativos y Medicina Interna.
Complejo Hospitalario de Jaén.

INTRODUCCIÓN

La vía subcutánea es la alternativa al fallo oral cuando el paciente terminal se encuentra en su domicilio.

Es eficaz (se alcanzan niveles plasmáticos de fármacos similares a los obtenidos por vía IV).

La vía subcutánea debería de ser también la vía de elección en el hospital cuando la vía intravenosa periférica es impracticable en pacientes en situación últimos días.

OBJETIVOS



- Visibilizar la eficacia de dicha vía en la atención de pacientes terminales en hospital.
- Extrapolar la aplicación de dicha vía a otras unidades de hospitalización para pacientes en situación de últimos días.

MÉTODOS

- Estudio descriptivo retrospectivo.
- Se revisaron todas las historias clínicas de pacientes atendidos en la unidad de hospitalización de la UGC de Cuidados Paliativos del Complejo hospitalario de Jaén del 1/07/14 al 31/12/14.



RESULTADOS



CONCLUSIONES

- ✓ La vía subcutánea es una vía eficaz y segura para el adecuado control del paciente en situación de últimos días cuando la vía venosa periférica es impracticable en el hospital.
- ✓ Su uso es extensible a otras unidades de hospitalización que atienden a pacientes en situación de últimos días.
- ✓ Es muy bien aceptada cuando el paciente hospitalizado y su familia reciben o solicitan el alta hospitalaria continuando el tratamiento en su domicilio.
- ✓ Su uso está documentado científicamente y sería deseable la formación del personal sanitario hospitalario en su indicación y cuidados.

BIBLIOGRAFÍA

1. Aguilera González C, Camacho Pizarro T, Cía Ramos R, Fernández López A, Garrido Nieto J, Romero Mena-Bernal J et al. Manual de uso de la vía subcutánea en cuidados paliativos. Fundación lavante. Málaga: 2010.
2. Trujillo Gómez CC, Montoya Restrepo M, Bruera E. Vías alternativas a la vía oral para administración sistémica de opioides en cuidados paliativos. Revisión de la literatura. Med Pal. 2008; 12(2): 108-122.
3. Soriano Fernández H, Ródenas García L, Moreno Escribano D, Roldan Castillo B, Castaño Moreno E, Palazón García E. Utilización de la vía subcutánea en Atención Primaria. Rev Clin Med Fam. 2009; 2(8): 426-433.