

Área 1: La Seguridad del Paciente en el área de Enfermería Médica.

FÁRMACOS QUE AMONTONAN EN SU BOTIQUÍN LOS PACIENTES TRATADOS CON ALDOCUMAR Y WARFARINA.

Autores. Vinagre Pérez, S. López de Pablo Martin De Bernardo, F

OBJETIVOS

Clasificar y analizar los medicamentos acumulados en los botiquines de pacientes poli medicados, tratados con Acenocumarol y Warfarina, mayores de 60 años y por actividad farmacológica-ATC, y saber si estos pacientes los consideran seguros.


RESULTADO

Fueron incluidos 90 pacientes, de los cuales el 58,8% (53) eran hombres y el 41,1% (37) mujeres con una edad media de $66,3 \pm 8$ años. El 52,2% acumulaba fármacos que no tenían como medicación crónica ni aguda. En total 247 envases de fármacos amontonados. Los subgrupos terapéuticos mas amontonados en los botiquines de estos pacientes fueron:

Analgésicos (22,26%), inhibidores de la HMG- CoA reductasa (13,36%), Hipolipemiantes (10,93%), inhibidores de la ECA (10,12%), Antiinflamatorios (16,19%), antiulcerosos inhibidores de la Bomba de protones (8,9%), Antibióticos (6,07%), Beta-Bloqueantes (4,04%), antiácidos (4,8%), y antitrombóticos (3,2%). Los medicamentos por principios activos más acumulados eran, paracetamol (55 envases), simvastatina (33), metformina (27), enalapril (25), ibuprofeno (28), omeprazol (22), amoxicilina (15), hidróxido de magnesio (12), y Bisoprolol (10).

Los mas acumulados: paracetamol
simvastatina
enalapril

Fármacos más acumulados por actividad farmacológica



CONCLUSIONES

El 52% de pacientes acumulaba fármacos no pautados en su medicación crónica.

Los medicamentos más acumulados eran los analgésicos seguidos de los inhibidores de la HMG y de los hipoglucemiantes.

El 35% de los pacientes entrevistados consideraban que esos fármacos no afectaban en la seguridad de su tratamiento con Acenocumarol y Warfarina.