

# Impacto de la Estrategia de Atención al Parto Normal en un Hospital Terciario

1Casteleiro Vallina A. 2Gil Urquiza MT. 3Santibáñez M.

1. Matrona, Doctoranda Universidad de Cantabria; [acasteleiro@msn.com](mailto:acasteleiro@msn.com) 2. Matrona, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 3. Profesor Ayte Dr en la Universidad de Cantabria



## INTRODUCCIÓN

En Cantabria, en Diciembre de 2005, se crea la “vía clínica del parto eutócico”(VCPE).

En Noviembre de 2007, el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo, publicó la Estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud(EAPN)(1). La cual, a través de la Estrategia de atención al parto normal del Servicio Cántabro de Salud(2), se instauró en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) entre el año 2008 y 2009.

Posteriormente, en el 2010 se editó por parte del Gobierno Vasco la Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal (GPCAPN) (3), como herramienta de acompañamiento de la Estrategia de Atención al parto normal en el SNS.

El objetivo general de la Estrategia de Atención al Parto Normal es “Potenciar la atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, mejorando la calidad asistencial y manteniendo los niveles de seguridad actuales”(1). Es en relación a este objetivo por el que consideramos la necesidad de evaluar el impacto que ha producido la implantación de esta estrategia en el “tipo de parto” como reflejo de la calidad asistencial y seguridad de la mujer en la asistencia en su parto.

Este estudio se centra en las recomendaciones de la EAPN acerca del parto instrumental y las cesáreas:

- En la EAPN se recomienda el uso de la ventosa como primera opción en el parto instrumental(1).
- Siguiendo las recomendaciones de la OMS la EAPN establece como un criterio de calidad una tasa de cesáreas menor al 15%(1).

## OBJETIVOS

- Observar el impacto de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el porcentaje de partos normales.
- Observar el impacto de la EAPN en el porcentaje de cesáreas.
- Observar el impacto de la EAPN en el porcentaje de partos instrumentales.


## METODOLOGÍA

Se trata de un estudio de tipo observacional. Para la realización del mismo se han recopilado los datos de: partos eutócicos, cesáreas y partos instrumentales, por ventosa y por fórceps, y se ha realizado un análisis temporal desde el año 2002 hasta el año 2014.

## BIBLIOGRAFÍA

1. Ministerio de Sanidad y Consumo; Observatorio de Salud de la Mujer y del Sistema nacional de Salud. Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud. [Monografía en internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo 2007; [acceso diciembre de 2014]. Disponible en: <http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estrategiaPartoEnero2008.pdf>
2. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Gobierno de Cantabria. Estrategia de Atención al Parto Normal del Servicio Cántabro de Salud; Cantabria: Dirección General de Salud Pública Consejería de Sanidad Gobierno de Cantabria 2007.
3. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica clínica sobre la Atención al parto normal. Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco. (OSTEBA). Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (Avalia-t). 2010. Guías de Práctica clínica en el SNS: OSTEBA Nº 2009/01[monografía en Internet]. [citadoDiciembre 2014]. Disponible en: <http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/guiaPracClinPartoCompleta.pdf>

## RESULTADOS



## CONCLUSIONES

1. Tras la publicación en el año 2005 de la VCPE en Cantabria se observa un aumento en el porcentaje de partos eutócicos, con una notable disminución del uso de fórceps y ventosas, sin embargo no se observa una gran variación en el porcentaje de cesáreas.
2. Los años 2008-2009, es el tiempo empleado para la implantación de la EAPN en Cantabria, por lo que no se observa modificación en la relación entre partos eutócicos y cesáreas.
3. A partir del 2009, año en el que la EAPN ya está implantada en Cantabria, se observa una tendencia a aumentar el porcentaje de partos eutócicos y una disminución en la tasa de cesáreas. Se observa igualmente una tendencia a aumentar el uso de la ventosa frente al fórceps.
4. En el año 2011 se observan los mejores resultados en cuanto a porcentajes de partos eutócicos y cesáreas. Lo cual puede relacionarse con la publicación en el año 2010 de la GPCAPN, la cual es una herramienta más práctica para su uso por los profesionales.
5. A partir del año 2011 se aprecia una tendencia a volver a los resultados previos a la implantación de la EAPN, de tal manera que en 2014 los resultados son peores que en el año 2008.

Es necesario realizar un estudio más pormenorizado, para conocer las causas de la no consecución de los estándares de calidad fijados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en Cantabria.