

Valoración de pacientes inmovilizados en Atención Primaria






Antonio Martínez Castillo. UGC Vera (Almería)

Introducción

La valoración del paciente inmovilizado para la posterior planificación de cuidados es una parcela muy importante del trabajo diario de enfermería en Atención Primaria.

Para ello nos ayudamos de cuestionarios/escalas tales como el cuestionario BARTHEL para valorar la autonomía en las actividades de la vida diaria (AVD), la escala NORTON, que mide el riesgo de úlceras por presión (UPP) y el test de PFEIFFER, para el cribado del deterioro cognitivo, entre otros.

Los objetivos de este estudio son: 1. Determinar el grado de aplicación de dichos cuestionarios sobre los pacientes inmovilizados y 2. Describir los resultados de los test realizados en los pacientes incluidos en el estudio.



Bibliografía

- Álvarez J, Aguilar J, Mercader I. Cognición y autonomía en mayores dependientes. Anales de psicología 2012; 28(3): 946-953
- Gázquez J, et al. Prevalencia de la dependencia funcional en personas mayores. Anales de psicología 2011; 27(3): 801-876
- González J, et al. La Escala de Norton como predictor de la calidad de vida relacionada con la salud en el anciano institucionalizado. Enfermería Clínica 2015; 25(6): 312-318